

	<p><b>Cartão do doente</b> <span style="float: right;">(PT)</span></p> <p><b>Informação importante para mulheres que possam engravidar</b> <b>WELIREG® (belzutifano)</b></p> <p>Não deve engravidar enquanto estiver a tomar WELIREG. Se estiver grávida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não tome WELIREG para a doença de von Hippel-Lindau.</li> <li>- Fale com o seu médico sobre a utilização de WELIREG para o tratamento de carcinoma de células renais.</li> </ul>
	<p><b>Patient card</b> <span style="float: right;">(EN)</span></p> <p><b>Important information for female patients who could become pregnant</b> <b>WELIREG® (belzutifan)</b></p> <p>You should not become pregnant while taking WELIREG. If you are pregnant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do not take WELIREG for von Hippel-Lindau disease.</li> <li>- Talk to your doctor about the use of WELIREG for the treatment of Renal Cell Carcinoma.</li> </ul>

70127131/00-1/5331



<ul style="list-style-type: none"> <li>• WELIREG pode prejudicar o seu bebé e causar aborto espontâneo.</li> <li>• Informe imediatamente o seu médico se está grávida, se pensa estar grávida, se engravidar ou se quer engravidar, antes e durante o tratamento com WELIREG.</li> <li>• O seu médico irá pedir-lhe um teste de gravidez antes de começar a tomar WELIREG.</li> </ul> <p><b>Contraceção (prevenção de gravidez)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Métodos contraceptivos com hormonas - tais como a pilula, injeções ou adesivos transdérmicos - podem não funcionar tão bem enquanto tomar WELIREG.</li> <li>• Utilize um método contraceptivo eficaz sem hormonas ou assegure que o seu parceiro utiliza preservativo para prevenir uma gravidez. Siga estas instruções enquanto estiver a tomar WELIREG e durante pelo menos 1 semana após a última dose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre quais os métodos contraceptivos adequados para si.</li> </ul> <p><b>Leia atentamente o folheto informativo para mais informações.</b></p> <p><b>Contactos importantes</b> O meu nome _____</p> <p>Nome do meu médico _____</p> <p>Contacto direto do hospital _____</p> <p style="text-align: right;"> MSD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• WELIREG may harm the baby in your womb and cause a miscarriage.</li> <li>• Talk to your doctor immediately if you are pregnant, think you are pregnant, you become pregnant, or you want to become pregnant, before and during WELIREG treatment.</li> <li>• Your doctor will do a pregnancy test before you start taking WELIREG.</li> </ul> <p><b>Contraception (pregnancy prevention)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Birth control methods that contain hormones - such as birth control pills, injections, or transdermal patches - may not work as well while taking WELIREG.</li> <li>• Use a reliable birth control method without hormones or have your male partner use a condom to prevent pregnancy. Do this while you are taking WELIREG and for at least 1 week after last dose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talk to your doctor or pharmacist about birth control methods that may be right for you.</li> </ul> <p><b>Read carefully the package leaflet for more information.</b></p> <p><b>Important contact details</b> My name _____</p> <p>Name of my doctor _____</p> <p>Office phone _____</p> <p>© 2026 Merck &amp; Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.  MSD</p>